

Коклюш - это инфекционное заболевание дыхательных путей, которое вызывается бактериями *Bordetella pertussis*. Характеризуется приступами спазматического кашля, интоксикацией и преимущественным поражением дыхательных путей.

Механизм заражения – воздушно-капельный. Восприимчивость к инфекции высокая. Группу особого риска составляют новорожденные. В возрасте до 1 года ребенок не имеет собственных антител, а материнские – не поступают, даже если у матери есть иммунитет против коклюша.

Главным признаком классического коклюша являются повторяющиеся приступы спазматического кашля.

5 вопросов о коклюше

Несмотря на широкое применение вакцинации, уровень заболеваемости коклюшем высок и в России и в нашем регионе в частности. Поэтому ответим на самые частые вопросы об этом заболевании.

1. Коклюшем болеют только дети?

Чаще и тяжелее коклюшем болеют дети, особенно младенцы, но взрослые тоже могут заболеть.

Исследования, проведенные среди взрослых с длительным кашлем, показали, что в 12,4 – 26% случаев причиной кашля являлся коклюш.

Часто именно взрослые, у которых коклюш не диагностирован, становятся источником инфекции для непривитых детей, в том числе самых маленьких, которые еще не

достигли возраста вакцинации.

2. Как передается коклюш?

Воздушно - капельным путем. Обильное выделение возбудителя происходит при чихании и кашле.

Коклюш очень заразен: в результате контакта с больным заражается до 90% людей без специфического иммунитета.

3. Какие симптомы у коклюша?

Первые симптомы похожи на ОРВИ: незначительное повышение температуры, насморк, чихание, общее недомогание, легкий кашель. К 3-й неделе кашель усиливается, становится спазматическим и приступообразным.

Во время приступа лицо краснеет или синеет, возможны носовые кровотечения или кровоизлияния в глаза.

Кашель при коклюше настолько сильный, что может приводить к переломам ребер и непроизвольному мочеиспусканию.

4. Коклюш — это опасное заболевание?

Да! Особенно для детей первых месяцев жизни. Это связано как с тяжелым течением самого коклюша, так и с более частым развитием осложнений.

Среди осложнений коклюша – пневмония, судороги и энцефалопатия, средний отит, синусит, грыжи, носовые кровотечения, кровоизлияния в мозг. Перенесенная в младенчестве инфекция может стать причиной задержки в развитии.

80% смертельных исходов от коклюша регистрируются у младенцев.

5. Как защититься от коклюша?

Самая эффективная мера профилактики – вакцинация.

Детей прививают по схеме:

V1 – в 3 месяца,

V2 – в 4,5 месяца,

V3 – в 6 месяцев,

RV – в 18 месяцев.

Берегите себя и будьте здоровы!

КОКЛЮШ

Коклюш — это инфекционное заболевание, вызываемое бактериями **Bordetella pertussis**.

Симптомы:



Катаральный период:

общее недомогание, повышение температуры, насморк, чихание, легкий кашель



Спастический период:

выраженный длительный приступообразный кашель, усиливающийся ночью



Осложнения коклюша:

пневмония, средний отит, синусит, энцефалопатии, переломы ребер, грыжи, кровоизлияние в мозг



Источник инфекции

Больной становится источником инфекции в катаральном периоде.

Передается воздушно-капельным путем

Вирус выделяется в окружающую среду во время чихания и кашля.

Коклюш очень заразен

В результате контакта с больным заражается до 90% окружающих, не имеющих специфического иммунитета.

Лучшая защита от коклюша – вакцинация!

Детей прививают по схеме:



V1 - в 3 месяца
V2 - в 4.5 месяца
V3 - в 6 месяцев



RV - в 18 месяцев